

چکیده

زمینه و هدف:

استفاده از شیمی درمانی در گذر سالها زیاد، به مبتلایان به سرطان ایدرمانو یا افزایش طول عمر کمکهای بسیار داشته است، ولی، متاسفانه در کنار هم هیبرتریهایی که داراست، پیامدهای مینیز، به دنبال دارد عوارض جانبی شیمی درمانی مانیدر ناحیه دهانی -

صورتی، شامل التهاب، زخم دهانی، افزایش شیوع عفونتها یویروسی، قارچی، باکتریایی و خونریزی است این عوارض، سبب درد چشمگیر، سوء تغذیه و حتی در مواردی، کاستن انداز هیشیمی درمانی از سوی پزشک در مانگر میشوند. این مطالعه با هدف تعیین عوارض دهانی و دندانی ناشی از سی کلوفسفاماید در بیماران مبتلا به سرطان پستان در بخش شیمی درمانی بهارستان شهید مصطفی، استان ایلام سال ۹۸ انجام شده است.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی - مقطعی است که بر روی بیماران مبتلا به سرطان پستان بیمارستان شهید مصطفی شهر ایلام در سال ۹۸-۹۹ انجام شد و از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید.

یافته ها: میانگین سنی بیماران 8.81 ± 50.89 و گستره سنی آنها بین ۳۶ تا ۶۹ سال بود، همچنین میانگین شاخص توده بدنی 24.18 ± 2.56 و گستره آن بین ۱۹-۲۹ بود. کلیه بیماران از نظر جنسیت مونث بودند. ۶۸.۱٪ بیماران لقی دندان، ۲۰.۳٪ فاقد جرم دندان، ۱۱.۶٪ فاقد دبری بودند. نتایج نشان داد ۸۹.۹ درصد بیماران با مصرف داروی سیکلوفسفاماید دچار عارضه دهان و دندان شده بودند. ۴۴.۹ درصد از بیماران دارای موكوزیت خفیف، هیچ کدام از آنها موكوزیت متوسط نداشتند و ۵۵.۱ درصد نیز دارای موكوزیت شدید بودند. بین خشکی دهان و شدت موكوزیت نیز ارتباط معنی داری یافت شد. بیماران دارای خشکی دهان با درجه کم و دارای درجه موكوزیت شدید بترتیب ۳۱.۳ و ۷۵ درصد گزارش شد.

نتیجه گیری: در مورد موكوزیت باید بر اهمیت رعایت بهداشت دهان در بیماران سرطانی تاکید کرد. هر چند مدارک علمی که نقش بهداشت دهان را در پیشگیری و درمان موكوزیت اثبات کند، وجود ندارد ولی اکثر محققین معتقدند که رعایت بهداشت دهان می تواند از طول مدت و همچنین شدت موكوزیت بکاهد.

کلید واژه ها: عوارض دهانی و دندان، سیکلوفسفاماید، سرطان پستان، ایلام